

Impfschema: Tierärztliche Praxis Maik Löffler

96268 Mitwitz, Kronacher Str. 33, Tel. 0 92 66 9 77 – 7, Fax 0 92 66 9 77 – 8,

Homepage: www.tierarzt-loeffler.de, E-Mail: info@tierarzt-loeffler.de

Sprechzeiten: Mo, Di, Do, Fr: 11 - 12 und 17 - 19 Uhr, Samstag: 11 - 12 Uhr, Mi: OP's

Hühner - Impfprogramm

- Stark vereinfacht, somit praktikabel -

<u>Alter</u>	<u>Vorbeugende Impfung</u>	<u>Kombination</u>	<u>Wie wird geimpft</u>
1. Tag	Mareksche Krankheit bei hohem Infektionsdruck nach 3 Wochen nachimpfen!		Injektion in den Oberschenkelmuskel oder unter die Nackenhaut
5.-9. Tag	Kokzidiose = rote Kükenruhr		über das Trinkwasser
3. Woche	Newcastle-Krankheit (ND)	Infektiöse Bronchitis (IB)	über das Trinkwasser
6. Woche	Infektiöse Laryngotracheitis (ILT)		Tränke oder Augentropfmethode
11. Woche	Newcastle-Krankheit (ND)	Infektiöse Bronchitis (IB)	über das Trinkwasser
14. Woche	Infektiöse Laryngotracheitis (ILT)		Tränke oder Augentropfmethode
20. Woche	Newcastle-Krankheit (ND)	Infektiöse Bronchitis (IB)	über das Trinkwasser
36. Woche	Newcastle-Krankheit (ND) Nachimpfung dann alle 3 Monate		über das Trinkwasser

Einige Impfungen können auch per Nadel geimpft werden, damit werden die Wirksamkeit und die Dauer des Impfschutzes verbessert! Auch gibt es Kombinationsmöglichkeiten mittels einer einzigen Injektion. ILT über die Tränke wird in doppelter Dosis gegeben!

Dieses Schema stellt die derzeit wichtigsten Impfungen dar und sollte je nach Seuchenlage oder individueller Situation angepasst werden. ILT und IB nicht überdosieren!

Weitere Impfmöglichkeiten: Gumboro-Krankheit (Infektiöse Bursitis), Egg drop-Syndrome, Hühnerschnupfen = Coryza contagiosa Komplex, Mycoplasmosen, Salmonellosen, Rotlauf, Gehirnhautentzündung (AE) usw..

Die Kokzidioseimpfung ist teuer, es müssen sich dann entsprechend viele Zuchtfreunde absprechen – bisher wenigstens nur 1000er Impfdosen erhältlich.

Aktualisiert: Januar 2014